

7 класс

(все задачи оцениваются исходя из 7-ми баллов, время на решение — 4 часа)

► **7-1.** Торговец купил на оптовом рынке партию ручек. Он предлагает покупателю либо одну ручку за 10 руб, либо три ручки за 20 руб. При этом его прибыль в рублях в обоих случаях одинакова. Какова оптовая цена ручки?

✎ **Ответ.** 5 руб.

✎ **Решение.** Пусть x – оптовая цена ручки. Тогда $10 - x = 20 - 3x$, откуда $x = 5$.

☛ **Критерии проверки.** Ответ без обоснования его единственности (например, только проверено, что этот ответ подходит) – 2 балла.


► **7-2.** Аборигены острова рыцарей всегда говорят правду, а аборигены острова лжецов всегда лгут. Первый абориген, глядя на двух других, сказал: «Вы живете на разных островах». Второй промолчал. А третий сказал: «Лжецов среди нас троих больше, чем рыцарей». Кто на каком острове живет?

✎ **Ответ.** Первый и второй – с острова рыцарей. Третий – с острова лжецов.

✎ **Решение.** Допустим, что третий сказал правду, тогда он – рыцарь, а двое других лжецы. Но это значит, что первый будучи лжецом, сказал правду. Следовательно, третий – лжец, поэтому его фраза лжива, то есть два других с острова рыцарей. Фраза первого при этом правдива.

☛ **Критерии проверки.** Только верный ответ (с проверкой или без проверки его правильности) – 2 балла.

► **7-3.** У Коли было шесть треугольников, у каждого из которых стороны занумерованы цифрами 1, 2, 3 (каждая цифра встречается ровно один раз). Он сложил из них шестиугольник как показано на рисунке. При этом оказалось, что треугольники примыкают друг к другу сторонами с одинаковыми номерами. Может ли сумма шести номеров наружных сторон треугольников равняться 11? Если может, нарисуйте пример, если не может, объясните, почему не может.



✎ **Ответ.** Не может.

✎ **Решение.** Сумма всех чисел равна 36 – четное число. Внутри шестиугольника номера образуют шесть одинаковых пар чисел, поэтому их сумма тоже четная. Поэтому сумма чисел наружных сторон должна быть четной и 11 равняться не может.

Критерии проверки. Рассмотрены отдельных конкретных случаев расположения чисел (при этом рассмотрены не все расположения) – 0 баллов.

► **7-4.** В каждой из 101 семей – три человека: папа, мама и ребенок. Все 303 человека выстроились в ряд. Оказалось, что родители каждого ребенка стоят с разных сторон от него (но, возможно, не рядом с ним). Докажите, что среди центральных 101 человека в этом ряду есть хотя бы один ребенок.

Решение. Назовем родителя левым (правым), если его ребёнок стоит в ряду левее (правее) него. Пусть все центральные 101 человек – родители. Тогда среди них либо левых, либо правых будет больше 50, то есть хотя бы 51. Пусть есть хотя бы 51 левых. Тогда все 51 их детей – среди первых 101 человека, и там же стоят 51 их вторых родителей. Противоречие. Случай 51 правых разбирается аналогично.

Критерии проверки. При доказательстве «от противного» показано, что среди левых (правых) 101 человека не меньше 51 ребенка, но дальнейшего содержательного продвижения нет – 1 балл.

► **7-5.** Есть 100 монет, из которых 2 фальшивые. Разрешается взять любые 10 монет и спросить, есть ли среди них фальшивая. Докажите, что за 18 таких вопросов можно гарантированно найти обе фальшивые монеты.

Решение. Разобьем монеты на 10 групп по 10 монет. Про каждую группу спросим, есть ли в ней фальшивая. Заметим, что после этого мы знаем по крайней мере 80 настоящих монет.

Первый случай. Фальшивые монеты в одной группе. Тогда разделим их на пять групп по две монеты, добавим в каждую по восемь настоящих монет и зададим еще 5 вопросов. После этого мы либо определим две фальшивые, либо определим две пары монет, в каждой из которых ровно по одной фальшивой монеты. Из каждой пары возьмем по одной, добавим девять настоящих и зададим вопросы, после которых мы определяем две фальшивые. Заметим, что нам потребовалось не более 17 вопросов.

Второй случай. Определены две группы по 10 монет, в каждой из которых по одной фальшивой монете. Теперь за четыре вопроса в первой из групп можно определить фальшивую. Для этого возьмем пять монет, добавим пять настоящих монет и зададим вопрос, после которого мы определим группу из пяти монет, в которой одна фальшивая. Еще один вопрос позволяет определить группу из двух или трех монет, в которой одна фальшивая. Действуя аналогично, оставшиеся два вопроса позволяют определить фальшивую. Еще четыре вопроса позволяют определить фальшивую среди десяти монет второй группы. Заметим, что нам потребовалось не более 18 вопросов.

Критерии проверки. Если алгоритм, предъявленный участником, хотя бы в одном случае требует более 18 действий – 0 баллов.

8 класс

(все задачи оцениваются исходя из 7-ми баллов, время на решение — 4 часа)

► **8-1.** Торговец купил на оптовом рынке партию ручек. Он предлагает покупателю либо одну ручку за 10 руб, либо три ручки за 20 руб. При этом его прибыль в рублях в обоих случаях одинакова. Какова оптовая цена ручки?

 **Ответ.** 5 руб.

 **Решение.** Пусть x – оптовая цена ручки. Тогда $10 - x = 20 - 3x$, откуда $x = 5$.

 **Критерии проверки.** Ответ без обоснования его единственности (например, только проверено, что этот ответ подходит) – 2 балла.

► **8-2.** Гонцу надо пробежать 24 мили. Две трети этого расстояния он бежал со средней скоростью 8 миль в час. Сможет ли он, увеличив скорость, пробежать остаток пути так, чтобы его средняя скорость на всем пути равнялась 12 миль в час?

 **Ответ.** Не сможет.

 **Решение.** Чтобы средняя скорость на всем пути равнялась 12 миль в час, он должен пробежать 24 мили за 2 часа. Но эти два часа он уже потратил на первые 16 миль.

 **Критерии проверки.** Ответ без обоснования – 0 баллов.

► **8-3.** Грани игрального кубика занумерованы числами от 1 до 6, каждый номер встречается ровно 1 раз. Петя сложил из восьми игральных кубиков куб вдвое большего размера так, что числа на прилегающих друг к другу гранях кубиков одинаковы. Может ли сумма всех 24 чисел, написанных на поверхности сложенного Петей куба, равняться 99?

 **Ответ.** Не может.

 **Решение.** Сумма всех чисел, написанных на гранях восьми кубиков, является четной. Можно просто ее вычислить и убедиться в этом. Сумма чисел на внутренних гранях кубиков составлена из пар одинаковых, поэтому тоже является четной. Разность этих сумм также должна быть четной и равняться 99 не может.

 **Критерии проверки.** Рассмотрение отдельных конкретных случаев расположения чисел на кубиках (при этом рассмотрены не все расположения) – 0 баллов.

► **8-4.** Есть 100 монет, из которых 2 фальшивые. Разрешается взять любые 10 монет и спросить, есть ли среди них фальшивая. Докажите, что за 18 таких вопросов можно гарантированно найти обе фальшивые монеты.

📎 **Решение.** Разобьем монеты на 10 групп по 10 монет. Про каждую группу спросим, есть ли в ней фальшивая. Заметим, что после этого мы знаем по крайней мере 80 настоящих монет.

Первый случай. Фальшивые монеты в одной группе. Тогда разделим их на пять групп по две монеты, добавим в каждую по восемь настоящих монет и зададим еще 5 вопросов. После этого мы либо определим две фальшивые, либо определим две пары монет, в каждой из которых ровно по одной фальшивой монеты. Из каждой пары возьмем по одной, добавим девять настоящих и зададим вопросы, после которых мы определяем две фальшивые. Заметим, что нам потребовалось не более 17 вопросов.

Второй случай. Определены две группы по 10 монет, в каждой из которых по одной фальшивой монете. Теперь за четыре вопроса в первой из групп можно определить фальшивую. Для этого возьмем пять монет, добавим пять настоящих монет и зададим вопрос, после которого мы определим группу из пяти монет, в которой одна фальшивая. Еще один вопрос позволяет определить группу из двух или трех монет, в которой одна фальшивая. Действуя аналогично, оставшиеся два вопроса позволяют определить фальшивую. Еще четыре вопроса позволяют определить фальшивую среди десяти монет второй группы. Заметим, что нам потребовалось не более 18 вопросов.

☞ **Критерии проверки.** Если алгоритм, предъявленный участником, хотя бы в одном случае требует более 18 действий – 0 баллов.

► **8-5.** Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$ такой, что $AD = AB + CD$. Оказалось, что биссектриса угла A проходит через середину стороны BC . Докажите, что биссектриса угла D также проходит через середину BC .

📎 **Решение.** Пусть E – середина BC . Отметим на стороне AD точку F такую, что $AB = AF$; тогда из условия $FD = AD - AF = CD$. Треугольники AEB и AEF равны по двум сторонам ($AB = AF$, AE – общая) и углу между ними. Значит, $EF = BE = EC$. Теперь получаем, что треугольники DEF и DEC равны по трём сторонам, откуда $\angle EDF = \angle EDC$, и точка E лежит на биссектрисе угла D , что и требовалось доказать.

Замечание. Несложно показать, что $AB \parallel CD$. Действительно, $\angle ABE = \angle AFE = 180^\circ - \angle DFE = 180^\circ - \angle DCE$, то есть сумма внутренних односторонних углов равна 180° .

☞ **Критерии проверки.** На AD отмечена точка F такая, что $AF = AB$ (и $DF = DC$) без дальнейшего содержательного продвижения – 0 баллов. Отмечена точка F и показано, что $EB = EF = EC$, где E – середина BC – 4 балла. Наличие или отсутствие доказательства, что $AB \parallel CD$, оценки не меняет.

9 класс

(все задачи оцениваются исходя из 7-ми баллов, время на решение — 4 часа)

► **9-1.** Натуральное число называется палиндромом, если оно не изменяется при записывании его цифр в обратном порядке (например, 626 – палиндром, а 2015 – нет). Можно ли число 2015 представить в виде суммы двух палиндромов?

 **Ответ.** $2015 = 1551 + 464$.

Можно показать, что этот пример единственен.

 **Критерии проверки.** Верный пример – 7 баллов. Приводить доказательство, что другие не подходят, или рассуждение, как пример был найден, не требуется. Неверный пример – 0 баллов.

► **9-2.** Гонцу надо пробежать 24 мили. Две трети этого расстояния он бежал со средней скоростью 8 миль в час. Сможет ли он, увеличив скорость, пробежать остаток пути так, чтобы его средняя скорость на всем пути равнялась 12 миль в час?

 **Ответ.** Не сможет.

 **Решение.** Чтобы средняя скорость на всем пути равнялась 12 миль в час, он должен пробежать 24 мили за 2 часа. Но эти два часа он уже потратил на первые 16 миль.

 **Критерии проверки.** Ответ без обоснования – 0 баллов.


► **9-3.** Пятнадцати ребятам раздали 101 белый, 101 синий и 101 красный шарик, причем Васе достались 3 белых, 4 синих и 5 красных шариков. Нерозданных шариков не осталось. Ребята встали в круг. Обязательно ли найдутся два соседа, которые не смогут отдать друг другу по нескольку шариков так, что после обмена у них двоих будут одинаковые наборы шариков?

 **Ответ.** Обязательно.

 **Решение.** Для того чтобы после обмена с соседом у Васи и его соседа было одинаковое число синих шариков, нужно, чтобы у соседа было четное число синих шариков. Эти рассуждения годятся и для соседа Васи. Поэтому у всех ребят должно быть четное число синих шариков, а их всего 101 шарик.

► 9-4. На стороне AC треугольника ABC взята точка D так, что $\angle BDC = \angle ABC$. Пусть K – точка пересечения биссектрис углов ABC и BDC . Докажите, что $AK = BK$.

✎ **Решение.** Пусть $\angle ABC = 2\alpha$. Тогда $\angle ABK = \angle CDK = \alpha$, значит, $\angle ABK + \angle ADK = \pi$. Отсюда следует, что четырехугольник $ABKD$ можно вписать в окружность. Тогда $\angle BAK = \angle BDK$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу. Значит, $\angle BAK = \alpha = \angle ABK$, то есть треугольник AKB равнобедренный.



☛ **Критерии проверки.** Доказано, что четырехугольник $ABKD$ можно вписать в окружность, – 3 балла.

► 9-5. По кругу выложены черные и белые шары, причем черных в два раза больше, чем белых. Известно, что среди пар соседних шаров одноцветных пар втрое больше, чем разноцветных. Какое наименьшее число шаров могло быть выложено?

✎ **Ответ.** 24.

✎ **Решение.** Так как чёрных шаров в два раза больше, чем белых, то общее количество шаров делится на три. Обозначим его через n . Все шары разбиваются на чередующиеся группы подряд идущих одноцветных шаров (группа может состоять и из одного шара). Так как цвета групп чередуются, то общее количество групп четно. Пусть количество групп каждого цвета равно k . Тогда разноцветных пар соседних шаров будет $2k$, а одноцветных $n - 2k$. Из условия задачи получаем, что $n - 2k = 3 \cdot 2k$. Отсюда $n = 8k$. Таким образом общее количество шаров делится и на три, и на восемь. Значит, n делится на 24, и потому $n \geq 24$. Примером может служить любой круг из 8 белых и 16 чёрных шаров, в котором по три чёрных и белых групп. Например, Белый – чёрный – белый – чёрный – шесть белых – четырнадцать черных.

☛ **Критерии проверки.** Только ответ – 0 баллов. Ответ с примером на 24 шара без доказательства, что меньше 24 шаров быть не может – 2 балла. Доказательство, что меньше 24 шаров быть не может, без примера на 24 шара – 4 балла. За использование без верного обоснования того факта, что количество разноцветных пар четно, оценка снижается на 1 балл. Доказано, что число шаров делится на 12, без дальнейшего содержательного продвижения – 1 балл.

10 класс

(все задачи оцениваются исходя из 7-ми баллов, время на решение — 4 часа)

► **10-1.** За лето однокомнатная квартира подорожала на 21%, двухкомнатная — на 11%, а суммарная стоимость квартир — на 15%. Во сколько раз однокомнатная квартира дешевле двухкомнатной?

 **Ответ.** В полтора раза.

 **Решение.** Пусть однокомнатная квартира стоила a рублей, двухкомнатная — b рублей. Тогда из условия задачи следует, что $1,21a + 1,11b = 1,15(a + b)$, откуда $1,5a = b$.

 **Критерии проверки.** Получено нужное уравнение с двумя переменными, а далее из уравнения сделаны неверные выводы или не сделано никаких выводов, — 3 балла. Решение, в котором рассмотрены конкретные цены квартир, — 2 балла. Только верный ответ — 0 баллов.

► **10-2.** Известно, что $a^2 + b^2 = 1 - ab$. Докажите, что $a^3 + b = b^3 + a$.

 **Решение.** Из условия $a^2 + ab + b^2 = 1$. Умножим обе части на $(a - b)$, получим $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 = a - b$. Поэтому $a^3 + b = b^3 + a$.

► **10-3.** Петя утверждает, что он может написать четыре различных двузначных числа, разность любых двух из которых — простое число. А Коля утверждает, что он может написать пять таких чисел. Объясните, кто из них прав, а кто не прав, и почему.

 **Критерии проверки.** Петя прав, а Коля не прав.

 **Решение.** Петя мог написать, например, числа 10, 12, 15, 17. Пусть существуют пять таких чисел. Тогда среди них найдутся по крайней мере три числа одной четности. Их разности — четные числа, но среди четных чисел существует только одно простое число, это число 2. Значит, любые два из этих трех чисел различаются на 2, а это невозможно.

 **Критерии проверки.** Пример на 4 числа оценивается исходя из 3-х баллов, доказательство того, что не может быть пять чисел, оценивается из 4-х баллов.

► **10-4.** Четырехугольник $ABCD$ – вписанный. На его диагоналях AC и BD отметили точки K и L соответственно, так, что $AK = AB$ и $DL = DC$. Докажите, что прямые KL и AD параллельны.

 **Решение.** Углы BLC и BKC равны, так как они являются смежными к углам при основании равнобедренных треугольников ABK и DCL , у которых равные углы при вершинах A и D (последнее следует из того, что они опираются на дугу BC окружности). Поэтому точки B, C, K, L лежат на одной окружности. Следовательно, $\angle KLD = \angle BCA = \angle BDA$. Итак, накрест лежащие углы при прямых KL и AD и секущей LD равны. Отсюда следует параллельность KL и AD .

Замечание. В нашем решении рассмотрен случай, когда точки B, C, K, L лежат на окружности именно в таком порядке. Но они могут лежать на окружности и в порядке B, C, L, K . Тогда рассуждения незначительно меняются.

 **Критерии проверки.** Доказано, что точки B, C, K, L лежат на одной окружности – 3 балла. Для получения полного балла достаточно полностью рассмотреть хотя бы один случай взаимного расположения точек B, C, K, L . За нерассмотрение остальных случаев баллы не снимаются.

► **10-5.** В некоторых клетках доски 100×100 стоит по фишке. Всего фишек N . При этом никакие две фишки не стоят в клетках, соседних по горизонтали или вертикали. Но если сдвинуть любую из фишек в какую-либо соседнюю клетку, это свойство нарушится. При каком наименьшем N возможна такая расстановка?

 **Ответ.** При $N = 100$.

 **Решение.** Пример расстановки — поставить 100 фишек по диагонали доски. Докажем, что меньше фишек поставить нельзя. Если на доске не более 99 фишек, то существует столбец без фишек, который делит доску на две части. Одна из частей может быть пустой, если выбранный столбец крайний. Если в одной части нет ни одной фишки, сдвинем в другой части фишку, ближайшую к выбранному столбцу, в направлении этого столбца, и у нее после этого не будет соседей. Если же фишки есть в обеих частях, то в одной из частей фишек не более 49 и в ней найдутся две идущие подряд пустые строки. Переместим в направлении этих строк ближайшую к ним фишку из этой части, и у нее после этого также не будет соседей.

 **Критерии проверки.** Верный пример оценивается в 1 балл.

11 класс

(все задачи оцениваются исходя из 7-ми баллов, время на решение — 4 часа)

► **11-1.** За лето однокомнатная квартира подорожала на 21%, двухкомнатная — на 11%, а суммарная стоимость квартир — на 15%. Во сколько раз однокомнатная квартира дешевле двухкомнатной?

 **Ответ.** В полтора раза.

 **Решение.** Пусть однокомнатная квартира стоила a рублей, двухкомнатная — b рублей. Тогда из условия задачи следует, что $1,21a + 1,11b = 1,15(a + b)$, откуда $1,5a = b$.

 **Критерии проверки.** Получено нужное уравнение с двумя переменными, а далее из уравнения сделаны неверные выводы или не сделано никаких выводов, — 3 балла. Решение, в котором рассмотрены конкретные цены квартир, — 2 балла. Только верный ответ — 0 баллов.

► **11-2.** Пусть $f(x)$ — квадратный трехчлен. Известно, что уравнение $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ имеет четыре различных корня, причем сумма этих корней равна нулю. Докажите, что тогда и сумма каких-то двух корней этого уравнения равна нулю.

 **Решение.** Если числа x_1, x_2 — корни уравнения $f(x) = 0$, то корнями уравнения $f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ будут числа $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}$. Тогда по условию $x_1 + x_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 0$. Преобразуем левую часть равенства:

$$x_1 + x_2 + \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = (x_1 + x_2)\left(1 + \frac{1}{x_1 x_2}\right).$$

Тогда либо $x_1 + x_2 = 0$ (и утверждение задачи верно), либо $1 + \frac{1}{x_1 x_2} = 0$. Во втором случае, домножив это равенство на x_1 , получим $x_1 + \frac{1}{x_2} = 0$, то есть утверждение верно и в этом случае.

 **Критерии проверки.** Замечено, что если x_1, x_2 — корни уравнения $f(x) = 0$, то корнями уравнения $f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ будут числа $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}$, но дальнейшего содержательного продвижения нет — 1 балл. Если некоторое выражение разложено в произведение двух множителей, которое равно 0, и из возникающих двух случаев верно рассмотрен только один, то это оценивается не выше чем в 4 балла. Если же один из двух случаев полностью потерян, то не выше 3-х баллов.

► **11-3.** Петя утверждает, что он может написать четыре различных двузначных числа, разность любых двух из которых – простое число. А Коля утверждает, что он может написать пять таких чисел. Объясните, кто из них прав, а кто не прав, и почему.

☞ **Критерии проверки.** Петя прав, а Коля не прав.

✎ **Решение.** Петя мог написать, например, числа 10, 12, 15, 17. Пусть существуют пять таких чисел. Тогда среди них найдутся по крайней мере три числа одной четности. Их разности – четные числа, но среди четных чисел существует только одно простое число, это число 2. Значит, любые два из этих трех чисел различаются на 2, а это невозможно.

☞ **Критерии проверки.** Пример на 4 числа оценивается исходя из 3-х баллов, доказательство того, что не может быть пять чисел, оценивается из 4-х баллов.

► **11-4.** В треугольной пирамиде проведены три биссектрисы плоских углов при вершине пирамиды, а также три биссектрисы основания пирамиды. Известно, что основания двух пар проведенных биссектрис совпадают. Докажите, что основания третьей пары биссектрис тоже совпадают.

✎ **Решение.** Пусть $SABC$ – треугольная пирамида с вершиной S , а SA_1, SB_1, SC_1 – биссектрисы боковых граней SBC, SAC, SAB соответственно. По условию AA_1, BB_1 биссектрисы основания ABC . По свойству биссектрисы имеем

$$\frac{SB}{SC} = \frac{BA_1}{CA_1} = \frac{AB}{AC}; \quad \frac{SC}{SA} = \frac{CB_1}{AB_1} = \frac{BC}{BA}.$$

Перемножая эти два равенства, получаем $\frac{SB}{SA} = \frac{BC}{AC}$. Но по свойству биссектрисы $\frac{SB}{SA} = \frac{BC_1}{AC_1}$, откуда $\frac{BC}{AC} = \frac{BC_1}{AC_1}$. Получается, что точка C_1 делит отрезок AB в том же отношении, что и основание биссектрисы, то есть она совпадает с этим основанием, что и требовала доказать.

► **11-5.** В некоторых клетках доски 100×100 стоит по фишке. Всего фишек N . При этом никакие две фишки не стоят в клетках, соседних по горизонтали или вертикали. Но если сдвинуть любую из фишек в какую-либо соседнюю клетку, это свойство нарушится. При каком наименьшем N возможна такая расстановка?

✎ **Ответ.** При $N = 100$.

✎ **Решение.** Пример расстановки – поставить 100 фишек по диагонали доски. Докажем, что меньше фишек поставить нельзя. Если на доске не более 99 фишек, то существует столбец без фишек, который делит доску на две части. Одна из частей может быть пустой, если выбранный столбец крайний. Если в одной части нет ни одной фишки, сдвинем в другой части фишку, ближайшую к выбранному столбцу, в направлении этого столбца, и у нее после этого не будет соседей. Если же фишки есть в обеих частях, то в одной из частей фишек не более 49 и в ней найдутся две идущие подряд пустые строки. Переместим в направлении этих строк ближайшую к ним фишку из этой части, и у нее после этого также не будет соседей.

☞ **Критерии проверки.** Верный пример оценивается в 1 балл.